



Australian Government

COVID-19 VACCINATION

لقاح Pfizer COVID-19 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 - 11 عاماً: معلومات للآباء وأولياء الأمور

نسخة 1

آخر تحديث: 20 ديسمبر 2021

معلومات عن اللقاح

يمكن أن يقي لقاح COVID-19 **Comirnaty (Pfizer)** الأطفال من الإصابة بـ COVID-19. يتألف جدول التطعيم للأطفال من 2 جرعتين تُعطى بفواصل 8 أسابيع. يمكن تقصير هذه الفترة الزمنية في ظروف خاصة إلى 3 أسابيع على الأقل.

لا يحتوي لقاح Pfizer COVID-19 على أي فيروس حي ولا يمكن أن يسبب COVID-19. يحتوي على الكود الجيني لجزء مهم من فيروس SARS-CoV-2 الذي يسمى بروتين سبايك. بعد تلقي التطعيم، يصنع جسم طفلك نُسخاً من بروتين سبايك. سيتعلم الجهاز المناعي لطفلك بعد ذلك التعرف على فيروس SARS-CoV-2 الذي يسبب COVID-19 ومكافحته. يقوم الجسم بتفكيك الشفرة الجينية بسرعة.

التطعيم طوعي ومجاني. يمكنك مناقشة أي مخاوف أو أسئلة لديك حول لقاح COVID-19 لطفلك مُزوّد التطعيم أو طبيبك قبل تلقي اللقاح.

فوائد اللقاح

على الرغم من أن معظم الأطفال الذين يصابون بـ COVID-19 يعانون من مرض خفيف، إلا أن بعض الأطفال، بما في ذلك أولئك الذين ليس لديهم تاريخ من الحالات الصحية، يمكن أن يصبحوا متوَعكون بـ COVID-19. الأطفال الذين يعانون من بعض الحالات الطبية (بما في ذلك أمراض الرئة المزمنة وأمراض القلب الخلقية والأمراض العصبية والسمنة ونقص المناعة) لديهم مخاطر أكبر للإصابة بمرض خطير أو الحاجة إلى دخول المستشفى إذا أصيبوا بـ COVID-19.

في الولايات المتحدة، تم الإبلاغ عن ما يقرب من 6000 حالة نادرة ولكنها خطيرة مرتبطة بـ COVID-19 تسمى متلازمة التهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال المرتبطة مؤقتاً بـ SARS-CoV-2 (PIMS-TS). يُعرف هذا أيضاً باسم متلازمة التهاب متعدد الأجهزة عند الأطفال (MIS-C). يحتاج معظم الأطفال الذين يعانون من PIMS-TS / MIS-C إلى العلاج في المستشفى وتوفي نسبة صغيرة من الأطفال المصابين بـ PIMS-TS / MIS-C. تتراوح أعمار معظم الأشخاص الذين أصيبوا بـ PIMS-TS / MIS-C بين 5 و 11 عاماً.

أظهرت تجربة سريرية أن لقاح Pfizer COVID-19 فعال في الوقاية من COVID-19 في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عاماً. كان الأطفال الذين تلقوا 2 جرعتين أقل عرضة للإصابة بفيروس COVID-19 بنسبة 91٪ مقارنة بالأطفال الذين لم يحصلوا على اللقاح.

يمكن للأطفال نقل الفيروس للآخرين بما في ذلك أفراد الأسرة الأكبر سناً الذين هم أكثر عرضة للإصابة بمرض خطير. غالباً ما يتغيب الأطفال المصابون عن المدرسة والأنشطة الأخرى.

عندما يتم تطعيم الأطفال، تقل مخاطر تعرضهم للعدوى ونشر COVID-19 لأفراد الأسرة والأصدقاء وغيرهم من الذين حولهم. قد يساعد الحد من انتشار COVID-19 في تقليل إغلاق المدارس وغيرها من تعطيل للأنشطة الخارجة عن المناهج الدراسية و للأنشطة الاجتماعية التي تؤثر بشكل كبير على رفاهة الأطفال وعائلاتهم.

سيساعد تطعيم طفلك أيضاً في العودة إلى الأنشطة العادية دون انقطاع، مثل الحاجة إلى العزل بعد الاتصال بشخص مصاب بفيروس COVID-19، وسيدعم التمتع الآمن بالأنشطة الأخرى مثل السفر إلى الخارج.

تبدأ الحماية ضد COVID-19 من حوالي 2 إلى 3 أسابيع بعد الجرعة الأولى. في حين أن جرعة واحدة قد توفر بعض الحماية، فقد تستمر فقط لمدى قصير. ستعطي الجرعتان حماية أفضل.

لا يوجد لقاح فعال بنسبة 100 في المائة، لذلك من المحتمل أن يمرض طفلك من COVID-19 بعد التطعيم. ومع ذلك، تُظهر الأدلة أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم أقل عرضة للإصابة بمرض خطير من COVID-19 أو يحتاجون إلى الذهاب إلى المستشفى.

سلامة اللقاح

تم اختبار سلامة لقاح Pfizer COVID-19 على أكثر من 3500 طفل تتراوح أعمارهم بين 5 - 11 عاماً في التجربة السريرية ومجموعة توسيع السلامة. أظهرت التجربة أن اللقاح آمن للأطفال وأن معظم الآثار الجانبية كانت خفيفة.

لقاح Pfizer COVID-19 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عاماً هو جرعة أصغر (ثلث المكون النشط للقاح) من لقاح الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً وأكثر.

في الولايات المتحدة، بدأ تطعيم الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 5 إلى 11 عاماً بلقاح Pfizer COVID-19 في 4 نوفمبر 2021. اعتباراً من 9 ديسمبر 2021، تلقى أكثر من 5 ملايين طفل في هذه الفئة العمرية جرعة واحدة على الأقل وتلقى أكثر من 2 مليوني طفل جرعتين من لقاح Pfizer COVID-19. لم يتم تحديد أي مخاوف محددة تتعلق بالسلامة في هذه الفئة العمرية في هذه المجموعة الكبيرة من السكان في العالم الحقيقي، حيث أن عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم أكبر بالفعل من حوالي 2.3 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5-11 عاماً في أستراليا.

الآثار الجانبية المتوقعة في أول يوم إلى يومين بعد التطعيم أقل شيوعاً لدى الأطفال منها لدى المراهقين والشباب. تشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً ألم في الذراع والصداع والإرهاق. عادة ما تختفي هذه الأعراض من تلقاء نفسها أو يتم علاجها بأدوية لا تستلزم وصفة طبية مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين. لا يحتاج الأطفال عادةً إلى زيارة الطبيب بسبب هذه الآثار الجانبية الخفيفة بعد تلقي لقاح COVID-19.

لدى لقاح فايزر COVID-19 خطر نادر جداً للإصابة بالتهاب القلب (يسمى التهاب عضلة القلب أو التهاب التامور). نادراً ما يحدث التهاب عضلة القلب و/ أو التهاب التامور عند الأشخاص الأصغر سناً، بما في ذلك المراهقون والأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً فما فوق، والذين تلقوا لقاح Pfizer Comirnaty أو لقاح Moderna Spikevax. وهو أكثر شيوعاً بعد الجرعة الثانية وعند الذكور. في الولايات المتحدة الأمريكية، من البيانات المبلغ عنها حتى 11 يونيو 2021، كان معدل التهاب عضلة القلب/ التهاب التامور لدى المراهقات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 12 - 17 عاماً 9.1 لكل مليون جرعة، وفي المراهقين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 12 - 17 عاماً كان 66.7 لكل مليون جرعة من لقاح mRNA COVID-19 تم إعطاؤه. من المتوقع أن يكون معدل وشدة التهاب عضلة القلب عند الأطفال أقل من مثيله عند المراهقين وغير قويا. يُلاحظ التهاب عضلة القلب بشكل أكثر شيوعاً عند الذكور الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً بعد الجرعة الثانية. معظم الأشخاص الذين عانوا من هذه الحالات بعد لقاحهم تعافوا تماماً.

لم تتضمن التجربة السريرية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عاماً عدداً كافياً من المشاركين لتقييم معدلات التهاب عضلة القلب أو التهاب التامور بعد التطعيم بلقاح Pfizer COVID-19، ولكن لم يتم تحديد مخاوف محددة تتعلق بالسلامة حتى الآن من ملايين الجرعات من هذا اللقاح المعطى في الخارج للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عاماً. تفوق فوائد التطعيم ذلك الخطر النادر جداً، ولا يزال التطعيم موصى به لجميع الفئات العمرية المؤهلة.

تقوم Therapeutic Goods Administration (TGA) بتقييم جميع اللقاحات في أستراليا. لكي تتم الموافقة على لقاح، يجب على TGA تقييم أنه آمن وفعال ومصنوع وفقاً لمعايير جودة عالية جداً. يتوفر وصف لعملية الموافقة على لقاحات COVID-19 على: www.tga.gov.au

تمت مراقبة سلامة لقاحات COVID-19 وستستمر في جميع مراحل برنامج التطعيم COVID-19، يتضمن ذلك للأطفال.

للحصول على معلومات حالية عن تكرر وشدة التهاب عضلة القلب والتهاب التامور بعد لقاح Pfizer COVID-19 ، راجع تحديثات اجتماعات COVID-19 الأسبوعية للمجموعة الاستشارية الفنية الأسترالية حول التحصين (ATAGI)، والمتوفرة على: www.health.gov.au/committee-and-groups/australian-technical-advisory-group-on-immunisation-atagi#statements

من الذي لا يجب أن يتلقى هذا اللقاح؟

يجب ألا يتلقى طفلك لقاح Pfizer COVID-19 إذا كان يعاني من:

- الحساسية المفرطة (نوع من الحساسية الشديدة) لجرعة سابقة من لقاح Pfizer COVID-19
- الحساسية المفرطة بعد التعرض لأي مكون من مكونات اللقاح، بما في ذلك البولي إيثيلين جلايكول (PEG)
- أي حدث ضار خطير آخر أكدته موفر التطعيم أو أخصائي طبي متمرس أنه ناتج عن جرعة سابقة من لقاح Pfizer COVID-19، دون تحديد سبب آخر.

تدابير وقائية من التطعيم

قد يحتاج الأطفال المصابون بحالات معينة إلى احتياطات إضافية مثل البقاء لمدة 30 دقيقة للمراقبة بعد أخذ اللقاح أو استشارة أخصائي الحساسية. أخبر مقدم التطعيم الخاص بك إذا كان طفلك يعاني من:

- رد فعل تحسسي لجرعة سابقة أو أحد مكونات لقاح Pfizer COVID-19
 - الحساسية المفرطة تجاه لقاحات أخرى أو أدوية أخرى - يمكن لمزود تطعيمك التحقق للتأكد من عدم وجود مكونات مشتركة مع لقاح COVID-19 الذي يتلقاه طفلك
 - كثرة الخلايا البدينة المؤكدة مع الحساسية المفرطة المتكررة التي تتطلب العلاج.
- أخبر مزود خدمات التطعيم إذا كان طفلك يعاني من مشاكل نزفية أو يتناول دواءً لتسييل الدم (مضاد للتخثر). سيساعدكم ذلك على تحديد ما إذا كان من الآمن أن يحصل طفلك على حقنة في العضل ويساعد في تحديد أفضل توقيت للحقن.

ظروف خاصة يجب مناقشتها قبل التطعيم

الأطفال المصابون بأمراض في القلب

يمكن للأطفال الذين لديهم تاريخ من أي من الحالات التالية تلقي لقاح Pfizer COVID-19. ومع ذلك، يجب عليك طلب النصيحة من طبيب عام GP أو متخصص تحصين أو طبيب قلب حول أفضل توقيت للتلقيح وما إذا كان يوصى بأي احتياطات إضافية.

- التهاب حديث (خلال الأشهر الثلاثة الماضية) في عضلة القلب أو التهاب التامور (التهاب القلب)
- الحمى الروماتيزمية الحادة (مع التهاب القلب النشط) أو أمراض القلب الروماتيزمية الحادة
- قصور القلب الحاد اللا تعويضي.

أخبر طبيبك إذا كان طفلك مصاباً بالتهاب عضلة القلب أو التهاب التامور الذي تم تشخيصه بعد جرعة سابقة من لقاح Pfizer COVID-19.

الأطفال الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة (نقص المناعة)

يوصى بشدة أن يتلقى الأطفال الذين يعانون من نقص المناعة لقاح COVID-19. لقاح Pfizer COVID-19 ليس لقاحاً حياً. إنه آمن عند الأطفال الذين يعانون من نقص المناعة.

الأطفال الذين يعانون من نقص المناعة، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية HIV، لديهم مخاطر أكبر للإصابة بمرض شديد من COVID-19، بما في ذلك خطر أعلى للوفاة.

قد يكون لدى بعض الأطفال المصابين بضعف المناعة استجابة مناعية منخفضة للقاح، لذلك من المهم التفكير في تدابير وقائية أخرى، مثل التباعد الجسدي، بعد التطعيم.

الأطفال الذين لديهم تاريخ بـ COVID-19

إذا كان طفلك قد أصيب بـ COVID-19 في الماضي، أخبر طبيبك أو مقدم خدمات التطعيم. لا يزال التطعيم ضد COVID-19 موصى به بشدة للأطفال الذين أصيبوا بالفعل بعدوى COVID-19. يمكن إعطاء لقاح COVID-19 بعد الشفاء من العدوى، أو يمكن تأجيله لمدة تصل إلى ستة أشهر بعد المرض الحاد (التأكد باختبار COVID-19). وذلك لأن الأدلة تشير إلى أن العدوى السابقة تقلل من خطر الإصابة مرة أخرى لمدة ستة أشهر على الأقل.

الأطفال الذين تلقوا مؤخراً لقاحاً آخر

يمكن للأطفال تلقي لقاحات أخرى بأمان في أي وقت قبل أو بعد أو في نفس وقت لقاح COVID-19. إذا كان طفلك قد تلقى مؤخراً لقاحاً آخر (خلال الـ 7 أيام الماضية)، فمن الأفضل إخبار مقدم التحصين الخاص بك حتى يتمكن من تقييم أي آثار جانبية بشكل صحيح.

الأطفال الذين يبلغون من العمر 12 عاماً قبل تلقيهم الجرعة الثانية

يحتوي لقاح Pfizer COVID-19 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عاماً على جرعة أصغر من مكون اللقاح النشط مقارنة بالجرعة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عاماً وأكثر. من المهم أن يحصل طفلك على اللقاح المناسب لعمره. إذا تلقوا جرعتهم الأولى عندما كان عمرهم 11 عاماً، واحتفلوا بعيد ميلادهم الثاني عشر قبل الجرعة الثانية، فمن الآمن أن يتلقوا لقاح Pfizer COVID-19 للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً و على جرعتهم الثانية. هذه أيضاً هي الممارسة المعتادة لأنواع اللقاحات الأخرى حيث توجد قوة جرعات مختلفة لفئات عمرية مختلفة.

ماذا تتوقع بعد التطعيم

كما هو الحال مع أي لقاح، قد يعاني طفلك من بعض الآثار الجانبية بعد تلقي لقاح COVID-19.

تتضمن الآثار الجانبية الشائعة بعد لقاح Pfizer COVID-19 لدى الأطفال ما يلي:

- ألم أو احمرار أو تورم في موقع الحقن
- إعياء
- صداع
- حمى وقشعريرة.

تشمل الآثار الجانبية الأقل شيوعاً بعد لقاح Pfizer COVID-19 في الأطفال ما يلي:

- آلام في المفاصل
- آلام في العضلات
- قيء.

عادة ما تكون هذه الآثار الجانبية خفيفة وتختفي في غضون يوم أو يومين.

إذا كان طفلك يعاني من ألم في موقع الحقن أو حمى أو صداع أو آلام في الجسم بعد التطعيم، فيمكنه تناول الباراسيتامول أو الإيبوبروفين. هذه تساعد في تقليل بعض الأعراض المذكورة أعلاه (لا يلزم تناول الباراسيتامول أو الإيبوبروفين قبل التطعيم). إذا كان هناك تورم في موقع الحقن، يمكن وضع كمادات باردة.

من بين الآثار الجانبية النادرة التي تم الإبلاغ عنها بعد لقاح Pfizer COVID-19 ما يلي:

- رد فعل تحسسي شديد (الحساسية المفرطة)
- التهاب العضلة القلبية (التهاب عضلة القلب)
- التهاب التامور (التهاب البطانة الخارجية للقلب).

يجب عليك طلب العناية الطبية بعد التطعيم إذا كان لدى طفلك:

- أعراض رد فعل تحسسي شديد، مثل صعوبة في التنفس، والصفير عند التنفس، وسرعة ضربات القلب، أو إذا أغمي على طفلك
- ألم في الصدر، ضغط أو عدم راحة، عدم انتظام ضربات القلب، تخطي الضربات أو "الررفة"، الإغماء، ضيق في التنفس، ألم مع التنفس

- أعراض جديدة أو غير متوقعة، أو إذا كنت قلقاً بشأن أحد الآثار الجانبية المحتملة
- أحد الآثار الجانبية المتوقعة للقاح والتي لم تختف بعد أيام قليلة، مثل الصداع أو الحمى أو القشعريرة.

بالنسبة للأعراض غير العاجلة، يمكنك زيارة مقدم الرعاية الصحية المعتاد الخاص بك (مثل طبيبك العام GP).

لا يزال بإمكان الأشخاص الملقحين الإصابة بـ COVID-19. حتى لو لم تظهر عليهم أعراض، أو كانت لديهم أعراض خفيفة فقط، فلا يزال بإمكانهم نقل الفيروس إلى الآخرين. هذا هو السبب في أنه من المهم بعد التطعيم الاستمرار في الإجراءات الوقائية الأخرى، مثل:

- التباعد الجسدي
- غسل الأيدي

- ارتداء قناع الوجه (حسب العمر)
- اختبار COVID-19 والحجر الصحي / العزل كما هو مطلوب من قبل ولايتك / إقليمك.

إذا تم تطعيم طفلك، فلا يزال يتعين عليه إجراء اختبار COVID-19 إذا ظهرت عليه أعراض تستوفي معايير الاختبار الخاصة بالسلطة الصحية المحلية.

مراقبة سلامة اللقاح والإبلاغ عن الآثار الجانبية

قد يتم الاتصال بك عن طريق الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني في الأسبوع الذي يلي تلقي طفلك كل جرعة من اللقاح لمعرفة ما يشعر به. هذا جزء من مراقبتنا المستمرة لسلامة لقاحات COVID-19.

يمكنك الإبلاغ عن الآثار الجانبية المشتبه بها التي يعاني منها طفلك لمقدم التطعيم أو غيره من أخصائي الرعاية الصحية. سيقومون بعد ذلك بإعداد تقرير رسمي نيابة عن طفلك إلى إدارة الصحة بالولاية أو الإقليم أو TGA.

إذا كنت تفضل الإبلاغ عن ذلك بنفسك، فيرجى زيارة www.tga.gov.au/reporting-suspected-side-effects-associated-covid-19-vaccine واتباع الإرشادات الموجودة على صفحة الموقع الإلكتروني.

اختبار COVID-19 بعد التطعيم

قد تتشابه بعض الآثار الجانبية الناتجة عن التطعيم ضد COVID-19 مع أعراض COVID-19 (مثل الحمى). ومع ذلك، فإن لقاح Pfizer COVID-19 لا يحتوي على أي فيروس حي ولا يمكن أن يسبب COVID-19.

قد لا يحتاج طفلك إلى إجراء اختبار COVID-19 أو العزل إذا:

- تظهر عليهم أعراض عامة مثل الحمى أو الصداع أو التعب في أول (2) يومين بعد التطعيم
- أنت متأكد من عدم وجود أي أعراض تنفسية لديهم (مثل سيلان من الأنف أو السعال أو التهاب في الحلق أو فقدان حاسة الشم أو فقدان حاسة الذوق).

ومع ذلك، يجب عليك التحقق من الإرشادات الحالية في ولايتك / إقليمك للحصول على أحدث المعلومات. قد تتغير هذه النصيحة إذا كان هناك تفشي لـ COVID-19 في منطقتك المحلية. قد يحتاج طفلك إلى إجراء اختبار COVID-19 إذا كان يستوفي معايير أخرى، على سبيل المثال إذا كانوا على اتصال وثيق بحالة COVID-19 معروفة. إذا كنت في شك، فاطلب التقييم الطبي.

تذكر موعدك القادم

من المهم أن يتلقى طفلك جرعتين من لقاح Pfizer COVID-19، بفاصل 8 أسابيع، لمجموعة جرعتهم الأولية. يمكن تقصير فترة الجرعات إلى 3 أسابيع على الأقل في حالات معينة، على سبيل المثال كجزء من الاستجابة المحلية للتفشي أو قبل أن يبدأ طفلك في أي علاج مثبت للمناعة. سينصح مزودك إذا كان يجب إعطاء الجرعة الثانية لطفلك في وقت مبكر.

من المرجح أن تؤدي الجرعة الثانية إلى إطالة مدة الحماية ضد COVID-19. ما لم تكن هناك ظروف خاصة، فمن الأفضل لطفلك أن يحصل على جرعته الثانية بعد 8 أسابيع بعد الأولى (بدلاً من فترة أقصر) لأن الاستجابات المناعية الأفضل تكون أكثر احتمالية بعد فترة أطول.

كيف يتم استخدام المعلومات الخاصة بك وتسجيلها

للحصول على معلومات حول كيفية جمع التفاصيل الشخصية لطفلك وتخزينها واستخدامها، تفضل بزيارة www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations.

إذا كان طفلك يتلقى التطعيم في صيدلية، فيجب أن تشارك الصيدلية بعض المعلومات الشخصية لطفلك مع Pharmacy Programs Administrator حتى يتمكن من المطالبة بالدفع من الحكومة الأسترالية. مزيد من المعلومات حول سبب الحاجة إلى ذلك وما هي المعلومات التي يتم مشاركتها متوفرة على الرابط أعلاه.

بموجب القانون، يجب على الشخص الذي يعطي التطعيم لطفلك تسجيله في Australian Immunisation Register. يمكنك قراءة سجل التطعيم الخاص بطفلك عبر الإنترنت من خلال:

- حساب Medicare
- حساب MyGov

- حساب My Health Record (يمكنك التسجيل لهذا برقم Medicare أو معرف رعاية صحية فردي Individual Healthcare Identifier).

مزيد من المعلومات

إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية حول تطعيم طفلك ضد COVID-19 ، فإن المواقع التالية تحتوي على بعض المعلومات المفيدة:

هل هذا صحيحاً؟ أحصل على الحقائق حول لقاحات COVID-19: www.health.gov.au/inituable-and-programs/covid-19-vaccines/is-it-true-19

أسئلة شائعة حول COVID-19 و تطعيم COVID-19 في الأطفال: www.ncirs.org.au/covid-19/covid-19-and-children-frequently-asked-questions

معلومات حول تطعيم الأطفال ضد COVID-19: <https://mvec.mcri.edu.au/references/covid-19-vaccination-in-children>

لقاحات COVID-19 للأطفال والمراهقين (CDC): www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/children-teens.html

للمزيد من المعلومات بلغتك، تفضل بزيارة www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages أو اتصل على 020 080 1800. لخدمات التَّرجَمَة الشفهية، اتصل على 131 450.

نموذج الموافقة على لقاح COVID-19: الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عاماً

قبل تعبئة هذا النموذج، تأكد من قراءة ورقة المعلومات أعلاه على لقاح COVID-19 Comirnaty (Pfizer).

آخر تحديث: 14 ديسمبر 2021

- قائمة التحقق من الموافقة
- | نعم | كلا | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1. هل أصيب طفلك مؤخراً بالسعال أو التهاب في الحلق أو الحمى، أو كان يشعر بتوعك بأي شكل من الأشكال؟ |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2. هل أصيب طفلك بـ COVID-19 من قبل؟ |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3. هل تلقى طفلك لقاح COVID-19 من قبل؟ |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4. هل عانى طفلك من رد فعل خطير نتيجة لقاح أو دواء؟ |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5. هل يعاني طفلك من ضعف في جهاز المناعة (نقص المناعة) أو أي اضطرابات مناعية؟ |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6. هل يعاني من مشاكل نزيفية أو مشاكل أخرى في الدّم، أو يتناول أي دواء لتسييل الدّم؟ |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 7. هل عانى طفلك من أي مشاكل في القلب؟ |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8. هل أنت أحد الوالدين / الوصي / صانع القرار البديل الذي لديه السلطة لتقديم الموافقة على التطعيم نيابة عن هذا الطفل؟ |

إذا أجبت بـ نعم على أي من الأسئلة من 1 إلى 7 ، فقد يظل طفلك قادراً على تلقي لقاح COVID-19 Pfizer ، ومع ذلك يجب عليك التحدث إلى طبيبك العام أو أخصائي التطعيم أو طبيب القلب أولاً لمناقشة أفضل توقيت للتطعيم وما إذا كانت هناك حاجة إلى أي احتياطات إضافية.

معلومات الطفل

الاسم:	
رقم Medicare:	
رقم Individual Health Identifier (IHI) إذا كان ينطبق:	
تاريخ الميلاد:	
العنوان:	

	الجنس:
	اللغة التي تتحدثونها في البيت:
	بلد المولد:

هل ابنك Aboriginal و/ أو Torres Strait Islander ؟

- نعم، Aboriginal فقط
 نعم، Torres Strait Islander فقط
 نعم، Aboriginal و Torres Strait Islander
 كلا
 أفضل عدم الاجابة

تفاصيل الوالد / الوصي

	اسم الوالد / الوصي:
	رقم الهاتف:
	عنوان البريد الالكتروني:

الموافقة على تلقي لقاح COVID-19

أؤكد بأن:

- لقد تلقيت وفهمت المعلومات التي تم تقديمها لي بشأن التطعيم ضد COVID-19 للطفل المذكور أعلاه
 لا تنطبق أي من الشروط المذكورة أعلاه على هذا الطفل، أو أنني ناقشت هذه الشروط وأي ظروف خاصة أخرى مع مقدم الرعاية الصحية المنتظم و / أو مقدم التطعيم
 أنا والد الطفل أو الوصي عليه أو صانع القرار البديل
 لدي سلطة تقديم الموافقة لهذا الطفل وأوافق على أن يتلقى الطفل المذكور أعلاه لقاح Pfizer COVID-19.

	اسم الوالد / الوصي / صانع القرار البديل:
	توقيع الوالد / الوصي / صانع القرار البديل:
	التاريخ:

تاريخ آخر تحديث: 14 (ديسمبر) 2021

لاستخدام المزود:

										الاسم:
										رقم Medicare:

الجرعة 1:

	تاريخ إعطاء التطعيم:
	وقت تلقيه:
	العلامة التجارية للقاح COVID-19:
	رقم الكمية المُعدة:
	الرَّقم المسلسل:
	موقع حقن التطعيم:
	اسم مزود خدمة التطعيم:

الجرعة 2:

	تاريخ إعطاء التطعيم:
	وقت تلقيه:
	العلامة التجارية للقاح COVID-19:
	رقم الكمية المُعدة:
	الرَّقم المسلسل:
	موقع حقن التطعيم:
	اسم مزود خدمة التطعيم:

آخر تحديث: 14 ديسمبر 2021